

VOTRE BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib) PLAN D'ACTION

(à faire remplir par un membre de votre équipe d'oncologie)

Nom du patient _____ *Nom complet* Date _____ *La date d'aujourd'hui*

Les effets secondaires discutés _____

Points clés _____

COMBINAISON POUR LE MÉLANOME PRISE DES MÉDICAMENTS :

- BRAFTOVI est pris par voie orale une fois par jour. Votre dose est de _____ gélules à la fois
- MEKTOVI se prend également par voie orale, deux fois par jour. Votre dose est de _____ comprimé(s) à la fois
- Si vous oubliez de prendre une dose de BRAFTOVI et qu'il reste moins de 12 heures jusqu'à la prochaine prise, NE PRENEZ PAS la dose oubliée. S'il reste plus de 12 heures avant votre la prochaine prise, prenez la dose oubliée
- Les deux médicaments peuvent être pris pendant ou en dehors des repas
- Aucune réfrigération n'est nécessaire
- Les doses de médicaments peuvent être réduites par votre équipe d'oncologie si vous avez certains effets secondaires ou d'autres problèmes
- Évitez le pamplemousse et son jus pendant toute la durée du traitement avec BRAFTOVI, car il peut avoir un effet sur la décomposition de BRAFTOVI dans votre corps et augmenter les effets secondaires

QUE FAIRE SI VOUS OUBLIEZ UNE DOSE :

- Si vous oubliez de prendre une dose de BRAFTOVI et qu'il reste moins de 12 heures jusqu'à la prochaine prise, NE PRENEZ PAS la dose oubliée. S'il reste plus de 12 heures avant votre la prochaine prise, prenez la dose oubliée.
- Si vous oubliez de prendre votre dose de MEKTOVI. S'il s'est écoulé 6 heures depuis l'heure ou vous auriez dû le prendre, NE PRENEZ PAS la dose oubliée. S'il vous reste plus de 6 heures avant la prochaine dose, prenez-la
- Si vous vomissez en prenant votre MEKTOVI ou BRAFTOVI, NE REPRENEZ PAS de dose. Prenez seulement votre prochaine dose à l'heure habituelle de la prise.

Les Moyens qui peuvent vous aider à vous souvenir de prendre vos médicaments à l'heure : Vous pouvez utiliser le calendrier ci-joint, en cochant à chaque fois que vous prenez une dose. Vous pouvez également utiliser une alarme de smartphone ou placer des rappels papier (post it) sur les miroirs, les portes ou sur votre ordinateur. Vous pouvez décider ce qui vous convient le mieux.

Assurez-vous avoir votre calendrier avec vous lors de vos rendez-vous avec votre équipe d'oncologie.

Si vous ou votre partenaire tombez enceinte ou pensez l'être : Informez immédiatement votre équipe d'oncologie et vos autres médecins que vous prenez ces médicaments, car ils peuvent nuire au développement du fœtus. Assurez-vous d'utiliser une contraception efficace si vous êtes une femme en âge de procréer ou un homme sexuellement actif.

Effets secondaires courants de cette thérapie combinée : Même les effets secondaires mineurs peuvent être graves et vous devez TOUS les signaler au à votre oncologue. Les effets secondaires les plus courants de la prise de BRAFTOVI/MEKTOVI sont :

- Fatigue
- Nausées
- Vomissement
- Diarrhée
- Douleur abdominale
- Douleurs/douleurs articulaires ou gonflement

SIGNALEZ TOUT CHANGEMENT DANS LA FAÇON DONT VOUS VOUS SENTEZ À VOTRE ONCOLOGUE :

Arrêtez de prendre vos médicaments et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un de ces signes :

- Une éruption cutanée ou une rougeur sur le corps
- Difficulté à respirer ou à avaler
- Gonflement du visage, des lèvres ou de la langue
- Oppression dans la gorge ou une voix rauque
- Se sentir faible
- Un rythme cardiaque rapide

Vous voudrez peut-être tenir un « journal de bord » pour noter vos traitements et la prise de vos médicaments, combien de pilules vous prenez, si vous ressentez des effets et à quel moment de la journée.

Assurez-vous d'apporter ce journal lors de vos rendez-vous avec votre équipe d'oncologie.



EFFETS SECONDAIRES IMPORTANTS :

Votre équipe d'oncologie peut vous sensibiliser à certains effets secondaires de BRAFTOVI/MEKTOVI qui peuvent entraîner de graves problèmes s'ils ne sont pas pris en charge immédiatement. La suite va vous fournir des informations sur les symptômes possibles, que vous devez signaler immédiatement à votre équipe d'oncologie, pour obtenir une aide médicale et une prise en charge rapide pour soulager les symptômes.

MODIFICATION DE LA PEAU

BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinaison pour le mélanome

Appelez immédiatement votre oncologue

Quels sont les symptômes ?

- Des bosses rougeâtres qui saignent ou ne guérissent pas
- Changements dans la taille ou la couleur des grains de beauté
- Les plaques de peau sont épaisses / dures un calus par exemple
- Démangeaison
- Une éruption cutanée
- Nouvelles verrues
- Plaie(s) cutanée(s)

Ce que vous devez décrire à votre équipe d'oncologie :

- A quel moment vous avez remarqué pour la première fois le changement ou les démangeaisons
- À quoi ressemble «l'éruption cutanée» - (par exemple, plate, bosselée, ressemblant à de l'acné, etc.)
- Sur quelle partie de votre corps l'éruption se trouve
- Si la modification cutanée vous empêche de vous habiller, de manger ou de dormir
- Si vous avez eu des problèmes de peau dans le passé et si ces symptômes se sont aggravés
- Si vous avez utilisé un nouveau savon ou de nouveaux produits chimiques ou avez été en contact avec des animaux récemment
- Si vous avez de nouvelles plaies cutanées, de nouvelles verrues, des bosses rougeâtres qui saignent/ne guérissent pas, ou un grain de beauté qui a changé
- Si vous avez commencé de nouveaux médicaments récemment
- Tout ce que vous avez essayé à la maison pour gérer les symptômes

Alerte rouge :

- Si vous avez une éruption qui couvre une grande partie de votre corps ou qui s'aggrave rapidement
- Toute cloque (sur votre peau ou dans votre bouche) qui pèle. Peau qui semble infectée (stries rouges, pus ou écoulement)
- Toute éruption cutanée accompagnée de fièvre (telle que définie par votre oncologue)

Appelez immédiatement votre oncologue. Si personne n'est disponible, rendez-vous directement aux urgences.

(A suivre)

(La continuation)

MODIFICATION DE LA PEAU

BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinaison pour le mélanome

Appelez immédiatement votre oncologue

Gérer les effets secondaires par vous-même :

- Évitez le savon. Utilisez plutôt des nettoyeurs doux sans savon
- Évitez les bains ou les douches chaudes ; utilisez de l'eau tiède pour le bain
- Évitez les vêtements serrés et les chaussures fermées
- Gardez vos ongles courts pour vous empêcher de vous griffer
- Appliquez quotidiennement une crème hydratante
- Protégez votre peau du soleil en appliquant un écran solaire (IP 50) et en portant un chapeau, des vêtements couvrant et anti-UV si possible et des lunettes de soleil. N'oubliez pas vos mains et votre visage
- Votre équipe d'oncologie peut vous dire de prendre un antihistaminique ou un analgésique pour réduire la douleur et les démangeaisons
- Avoir des examens cutanés réguliers avant de commencer le traitement, tous les 2 mois pendant le traitement et pendant 6 mois après la fin du traitement
- Si vous prenez des médicaments pendant le traitement, informez-en votre équipe d'oncologie



PROBLÈMES DES YEUX ET DE LA VUE

BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinaison pour le mélanome

Appelez immédiatement votre oncologue

Quels sont les symptômes ?

- Douleur, enfllement ou rougeur des yeux
- Vision floue
- Voir des points colorés
- Perte partielle ou totale de la vue
- Voir des auréoles ou d'autres problèmes de vision
- Voir double
- Sensibilité à la lumière

Ce que vous devez décrire à votre équipe d'oncologie :

- A quel moment vous avez commencé à avoir des problèmes de vision, quelle en est l'intensité et combien de temps cela a duré
- Si vous avez eu des problèmes de vision dans le passé, comme des yeux secs ou un glaucome et si ces symptômes se sont aggravés
- Si vous avez récemment subi une blessure à l'œil, commencé un nouveau traitement ou avez été exposé à des produits chimiques
- Si vous portez des lentilles de contact
- Si vous êtes diabétique
- Si vous présentez d'autres symptômes, tels qu'un mal de tête, des vomissements ou des nausées
- La dernière fois que vous avez passé un examen de la vue

Alerte rouge :

- Si vous présentez des symptômes soudains et sévères, tels que des changements soudains de la vision, des douleurs oculaires, des rougeurs ou une sensibilité inhabituelle à la lumière du soleil et de l'éblouissement
- Incapacité à effectuer des activités régulières de la vie quotidienne en raison de problèmes oculaires
- Perte de vision progressive ou soudaine

Appelez immédiatement votre oncologue. Si personne n'est disponible, rendez-vous directement aux urgences.

Gérer les effets secondaires par vous-même :

- Suivez les instructions de votre équipe d'oncologie pour passer des examens de la vue chez l'ophtalmologiste
- Portez des lunettes de soleil pour protéger vos yeux des rayons nocifs du soleil
- Si vous portez des lentilles de contact, veillez à suivre les directives pour bien hydrater vos yeux et pour nettoyer, mouiller et remplacer les lentilles.
- Si vous souffrez de diabète, maintenez votre glycémie sous contrôle afin de réduire le risque de maladie oculaire
- Suivez un mode de vie sain afin de prendre soin de vos yeux ainsi que de votre corps
- Si vous prenez des médicaments pendant le traitement, informez-en votre équipe d'oncologie

PROBLÈMES CARDIAQUES

BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinaison pour le mélanome

Appelez immédiatement votre oncologue

Quels sont les symptômes ?

- Sentir que votre cœur bat anormalement, trop vite ou trop fort
- Changements du niveau d'énergie
- Se sentir «essoufflé» lorsque vous faites des efforts ou essoufflé au repos
- Un changement au niveau d'une toux ou une respiration sifflante préexistante (siffler en respirant)
- Transpiration excessive
- Enflure des bras ou des jambes (y compris les chevilles)
- Des étourdissements
- Des évanouissements
- Des douleurs thoraciques

Ce que vous devez décrire à votre équipe d'oncologie :

- A quel moment vous avez commencé à avoir l'un de ces symptômes, quelle en est l'intensité et combien de temps cela a duré
- Si vous aviez l'un de ces symptômes avant de commencer BRAFTOVI/MEKTOVI et s'ils se sont aggravés
- Si on vous a déjà dit que vous souffriez d'une maladie cardiaque
- Ce qui aggrave ou améliore les symptômes
- Si vous avez pris récemment de nouveaux médicaments (prescrits ou en vente libre)
- Si vous avez déjà subi une radiothérapie

Alerte rouge :

- L'apparition soudaine de ces symptômes.
- Toute douleur thoracique
- Difficulté à respirer
- Évanouissement
- Incapacité d'effectuer vos activités habituelles en raison de vos symptômes

Appelez immédiatement votre oncologue. Si personne n'est disponible, rendez-vous directement aux urgences.



Gérer les effets secondaires par vous-même :

- Suivez les instructions de votre équipe d'oncologie au sujet des contrôles cardiaques à faire effectuer.
- Assurez-vous de boire suffisamment pour rester hydraté
- Évitez de boire de l'alcool ou de prendre des drogues qui affectent le cœur ou le cerveau (comme la marijuana, les somnifères ou les stimulants) à moins que vos professionnels de la santé ne vous disent de le faire
- Adoptez un mode de vie sain afin de prendre soin de votre cœur ainsi que de votre corps
- Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou le cœur, assurez-vous de les prendre comme indiqué et de ne manquer aucune dose. Si vous prenez des médicaments pendant le traitement, informez-en votre équipe d'oncologie

DOULEUR ARTICULAIRE, GONFLEMENT OU RAIDEUR

BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Combinaison pour le mélanome

Appelez immédiatement votre oncologue

Quels sont les symptômes ?

- Douleur articulaire
- Raideur articulaire
- Enfllement des articulations
- Difficulté à marcher ou à effectuer vos activités quotidiennes
- Rougeur au niveau d'une articulation

Ce que vous devez décrire à votre équipe d'oncologie :

- A quel moment ces symptômes ont commencé, quelles en sont les causes et combien de temps ont-ils duré
- Quelles articulations sont affectées
- Si vous avez déjà eu des problèmes articulaires dans le passé et si vos symptômes se sont aggravés
- Tout ce que vous avez essayé à la maison pour gérer les symptômes

Alerte rouge :

- Une apparition soudaine ou sévère de douleurs articulaires, de gonflement ou de raideur
- Si l'articulation semble être déformée
- Si vous ne pouvez pas mettre de poids sur l'articulation (la cheville, par exemple) ou vous en servir du tout

Appelez immédiatement votre oncologue. Si personne n'est disponible, rendez-vous directement aux urgences.



Gérer les effets secondaires par vous-même :

- Renseignez-vous auprès de votre équipe d'oncologie sur l'utilisation d'anti-inflammatoires/analgésiques tels que l'aspirine, l'ibuprofène pour soulager la douleur et la raideur. Demandez leur le dosage à prendre
- Appliquez du froid sur les articulations gonflées pendant 15 minutes plusieurs fois par jour
- Gardez l'articulation au-dessus de votre cœur quand vous le pouvez pour réduire le gonflement
- Utilisez une bande élastique ou du ruban adhésif sur l'articulation pour la renforcer
- Évitez les activités qui aggravent la douleur, mais essayez de maintenir une routine physique, si possible
- Si vous prenez des médicaments pendant le traitement, informez-en votre équipe d'oncologie

AUTRES SYMPTÔMES À SURVEILLER

Vous trouverez ci-dessous d'autres symptômes que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib). Portez une attention particulière à tout symptôme coché. Veuillez appeler votre oncologue si vous développez l'un de ces symptômes et envisagez de vous rendre directement aux urgences si vous présentez l'un des symptômes de 'l'alerte rouge'.

✓	Les symptômes	Alerte rouge ('signe qu'il pourrait se passer quelque chose de grave nécessitant une attention immédiate)
	Modifications des selles ou constipation (selles peu fréquentes)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vos selles sont noires ou rouges et que vous avez des douleurs et de la fièvre (telles que définies par votre équipe d'oncologie)
	Diarrhée (selles molles ou fréquentes)	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs intenses à l'estomac ; des selles qui sont sanglantes ou qui ressemblent à du goudron
	Vertiges (étourdissements)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous vous évanouissez
	Fatigue (se sentir faible ou fatigué)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous vous évanouissez ou si vous êtes trop faible pour sortir du lit
	Fièvre (température élevée, frissons et fatigue)	<ul style="list-style-type: none"> • Si votre température dépasse >40.0°C ou si vous avez une température supérieure >38.5°C et vous avez des frissons sévères, vous vous évanouissez ou avez du mal à uriner
	Maux de tête	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez un mal de tête très douloureux (le "pire mal de tête de votre vie »), des maux de tête qui ne disparaissent pas après quelques heures, ou des maux de tête avec fièvre, douleur ou raideur au cou et/ou éruption cutanée
	Douleurs musculaires, autres douleurs, spasmes ou faiblesse	<ul style="list-style-type: none"> • Si ces symptômes se produisent avec l'obscurité, urine rougeâtre
	Nausées (sensation que vous allez vomir)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez des nausées incontrôlables qui vous empêchent de manger et/ou de boire
	Problèmes paralysie faciale (bave, difficulté à sourire, ou votre bouche semble « tomber »)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez des difficultés à parler ou si vous avez d'autres zones du corps qui s'affaiblissent ou que vous n'arrivez pas à bouger

(A suivre)

(La continuation)

✓	Les symptômes	Alerte rouge ('signe qu'il pourrait se passer quelque chose de grave nécessitant une attention immédiate)
	Réactions au soleil (coup de soleil, peau rouge, douloureuse, sèche, qui démange et qui est chaude au toucher, éruption cutanée, irritation de la peau, bosses, peau épaisse, sèche et ridée)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez des rougeurs sur tout le corps, des cloques sur la peau ou dans la e bouche, et/ou votre pelures de peau
	Essoufflement (difficulté à respirer)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez des difficultés à reprendre votre souffle au repos • Si vous souffrez d'essoufflement et de douleurs thoraciques et/ou évanouissement
	Inflammation cutanée (gonflement) dans les zones traitées par rayonnement	—
	Douleur d'estomac	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous ressentez une douleur ou une sensibilité soudaine ventre, sang dans les selles, vous vomissez du sang, et/ou votre peau ou vos yeux deviennent Jaunes
	Gonflement des bras ou des jambes	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez une partie de la jambe chaude et sensible qui ne refroidit pas lorsque vous mettez du froid dessus, et/ou si la tâche démange ou qu'il y a des picotements, et/ou le la douleur empire sans raison
	Urine, foncée ou rougeâtre	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez du sang rouge vif dans vos urines ou si en même temps, vous avez des étourdissements, ou des douleurs dans le dos ou sur le côté, goût métallique dans votre bouche, mal à l'estomac, des vomissements, sensation de grande fatigue, essoufflement essoufflement et/ou gonflement des bras, des jambes ou du Visage
	Mictions, moins fréquentes que d'habitude	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez également du sang dans les urines, un enflent gonflement des chevilles, et une absence d'envie de manger
	Mictions, plus fréquentes que d'habitude	—
	Saignement vaginal	<ul style="list-style-type: none"> • Si vos règles sont plus abondantes que la normale, vous saignez entre vos règles ou vous avez Des saignements après la ménopause
	Vomissements (vomissements)	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous êtes incapable de manger ou de boire pendant plus de 8 heures, et/ou vous vomissez du sang ou vous avez des fortes douleurs à l'estomac
	Vomir du sang	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous vomissez du sang

Votre calendrier de prises de Braftovi / Mektovi

DATE DE DÉBUT: _____

Semaine 1	journée							
	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	
Semaine 2	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	
Semaine 3	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>
Semaine 4	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>	Date: _____ ☀ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> ☾ MEKTOVI (bini) <input type="checkbox"/> BRAFTOVI (enco) <input type="checkbox"/>

bini = binimetinib; enco = encorafenib

En cas d'oubli d'une dose de Mektovi (binimetinib) : La dose oubliée ne peut être prise que s'il reste plus de 6h avant la prochaine prise. Elle ne doit pas être prise dans les 6 heures qui précèdent la dose suivante et ne prenez jamais de double dose en cas d'oubli.

En cas d'oubli d'une dose de Braftovi (encorafenib) : La dose oubliée ne peut être prise que s'il reste plus de 12h avant la prochaine prise. S'il reste 12h ou moins, attendez la prochaine prise. Ne prenez jamais double dose pour compenser la dose oubliée.

Ne reprenez pas de dose supplémentaire de Braftovi (encorafenib) ou de Mektovi (binimetinib) si vous vomissez après l'avoir prise.

Pour plus d'informations sur la prescription et les symptômes de Braftovi (encorafenib) : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information_en.pdf

Pour plus d'informations sur la prescription et les symptômes de Mektovi (binimetinib) : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mektovi-epar-product-information_en.pdf