



### WIE SIE IHRE MEDIKAMENTE EINNEHMEN:

- BRAFTOVI wird einmal täglich oral eingenommen. Ihre Dosis ist Kapseln auf einmal \_\_\_\_\_.
- MEKTOVI wird auch zweimal täglich oral eingenommen. Ihre Dosis ist Tabletten auf einmal \_\_\_\_\_.
- Beide Medikamente können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden
- Keine Kühlung erforderlich
- Die Dosen der Medikamente können aufgrund Ihrer Onkologie Team gesenkt werden, wenn Sie bestimmte Nebenwirkungen oder andere Probleme haben
- Vermeiden Sie Grapefruitsaft oder Grapefruit während der Einnahme
  - BRAFTOVI, da es den Abbau beeinflussen kann
  - BRAFTOVI in Ihrem Körper und verstärkt Nebenwirkungen

### WAS TUN, WENN SIE EINE DOSIS VERPASSEN:

- Wenn Sie die Einnahme Ihrer BRAFTOVI-Dosis versäumt haben und diese niedriger ist als 12 Stunden bis zu Ihrer nächsten Dosis, **NEHMEN** Sie die nicht ein vergessene Dosis. Wenn es mehr als 12 Stunden bis zu Ihrem nächsten Dosis sind nehmen Sie die Dosis
- Wenn Sie die Einnahme Ihrer MEKTOVI-Dosis um mehr als 6 Stunden versäumt haben vor der geplanten Zeit, **NEHMEN SIE NICHT** das verpasste Dosis. Wenn es innerhalb von 6 Stunden nach der geplanten Zeit liegt, nehmen Sie es die Dosis
- Wenn Sie während der Einnahme von MEKTOVI oder BRAFTOVI erbrechen, **NEHMEN SIE KEINE** Extradosis ein. Warte einfach bis zu Ihren nächste Dosis zur gewohnten Zeit.

**Möglichkeiten, die Ihnen helfen können, sich an die Einnahme Ihrer Pillen zu erinnern:** Sie können den beigefügten Kalender verwenden und jede Dosis, die Sie einnehmen, abhaken. Sie können auch einen Smartphone-Alarm verwenden oder Erinnerungen an Spiegeln, Türen oder Ihrem Laptop anbringen. Sie können entscheiden, was für Sie am besten funktioniert.

Bringen Sie unbedingt Ihren Kalender zu Ihren Besuchen bei Ihrem Onkologieteam mit.

**Wenn Sie oder Ihre Partnerin schwanger werden:** Informieren Sie sofort Ihr Onkologieteam, wenn Sie oder Ihre Partnerin schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein, während Sie diese Medikamente einnehmen, da sie einem sich entwickelnden Fötus schaden können. Stellen Sie sicher, dass Sie eine wirksame Empfängnisverhütung anwenden, wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter oder ein sexuell aktiver Mann sind. BRAFTOVI kann bei Männern zu Fruchtbarkeitsproblemen führen – sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt, wenn Sie Bedenken haben.

**Häufige Nebenwirkungen dieser Kombinationstherapie:** Selbst geringfügige Nebenwirkungen können schwerwiegend sein und Sie sollten ALLE davon der Praxis Ihres Onkologen melden. Die häufigsten Nebenwirkungen der Einnahme von BRAFTOVI/MEKTOVI sind...

- Müdigkeit
- Übelkeit
- Erbrechen
- Durchfall
- Bauchschmerzen
- Gelenkschmerzen/Schmerzen oder Schwellungen

## MELDEN SIE ALLE VERÄNDERUNGEN IHRES BEFINDENS DEM BÜRO IHRES ONKOLOGEN

Brechen Sie die Einnahme Ihrer Medikamente ab und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn Sie eines dieser Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion haben:

- Ein Ausschlag oder eine Rötung am ganzen Körper
- Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken
- Schwellung des Gesichts, der Lippen oder Zunge
- Engegefühl im Hals oder eine heisere Stimme
- Schwächegefühl
- Ein schneller Herzschlag

Sie können ein Notizbuch als Ihr Behandlungstagebuch führen und aufschreiben, wann Sie Ihre Pillen einnehmen, wie viele Pillen Sie einnehmen und ob Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben.

Bringen Sie dieses Behandlungstagebuch unbedingt zu Ihren Besuchen bei Ihrem Onkologieteam mit.



## WICHTIGE NEBENWIRKUNGEN:

Ihr Onkologieteam kann einige Nebenwirkungen von BRAFTOVI/MEKTOVI besprechen, die zu ernsthaften Problemen führen können, wenn sie nicht sofort behandelt werden. Diese Abschnitte enthalten Informationen über mögliche Symptome, was Sie Ihrem Onkologieteam mitteilen sollten, wann Sie sofort medizinische Hilfe benötigen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um die Symptome zu lindern.

# HAUTVERÄNDERUNGEN

## BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Kombination für Melanom

*Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen*

### Was sind die Symptome?

- Rötliche Beulen, die bluten oder nicht heilen
- Veränderungen in der Größe oder Farbe von Muttermalen
- Hautflecken fühlen sich dick/zäh an (wie eine Hornhaut)
- Juckreiz
- Ein Ausschlag
- Neue Warzen
- Hautwunde(n)

### Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wenn Sie die Hautveränderung oder den Juckreiz zum ersten Mal bemerkt haben
- Wie der „Ausschlag“ aussieht – (z. B. flach, uneben, akneartig usw.)
- Wo und wie viel von Ihrem Körper der Ausschlag bedeckt
- Wenn die Hautveränderung es Ihnen schwer macht, sich anzuziehen, zu essen oder zu schlafen
- Wenn Sie in der Vergangenheit Hautprobleme hatten und wenn sich diese Symptome verschlimmert haben
- Wenn Sie in letzter Zeit eine neue Seife verwendet haben oder in der Nähe von neuen Chemikalien oder Tieren waren
- Wenn Sie neue Hautwunden, neue Warzen, rötliche Beulen haben, die bluten/nicht heilen, oder ein Muttermal, das sich verändert hat
- Wenn Sie kürzlich mit der Einnahme neuer Medikamente begonnen haben
- Alles, was Sie zu Hause versucht haben, um die Symptome zu behandeln

### Rote Flaggen:

- Wenn Sie einen Ausschlag haben, der einen großen Teil Ihres Körpers bedeckt oder sich schnell verschlimmert
- Alle Blasen (auf Ihrer Haut oder in Ihrem Mund), die sich ablösen. Haut, die infiziert aussieht (rote Streifen, Eiter oder Ausfluss)
- Jeder Hautausschlag, der von Fieber begleitet wird (wie von Ihrem Onkologen definiert)

### Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Vermeiden Sie Seife. Verwenden Sie stattdessen sanfte, seifenfreie Reinigungsmittel wie Cetaphil®, Eucerin® und NutriBiotic®
- Vermeiden Sie heiße Bäder oder Duschen; Verwenden Sie zum Baden lauwarmes (warmes) Wasser
- Vermeiden Sie enge Kleidung und Schuhe
- Halten Sie Ihre Fingernägel kurz, um zu verhindern, dass Sie Ihre Haut durch Kratzen verletzen
- Trage täglich eine Feuchtigkeitscreme auf
- Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne, indem Sie Sonnencreme (30 SPF oder höher), einen Hut und UV-schützende Kleidung und Sonnenbrille tragen. Hände und Gesicht nicht vergessen
- Ihr Onkologieteam kann Ihnen sagen, dass Sie ein Antihistaminikum oder Schmerzmittel einnehmen sollen, um die Schmerzen und den Juckreiz zu lindern
- Führen Sie regelmäßige Hautuntersuchungen vor Beginn der Behandlung, alle 2 Monate während der Behandlung und für 6 Monate nach Abschluss der Behandlung durch
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

**Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme.**

# AUGEN- UND SICHTPROBLEME

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**

Kombination für Melanom

*Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen*

## Was sind die Symptome?

- Augenschmerzen, Schwellung oder Rötung
- Verschwommenes Sehen
- Farbige Punkte sehen
- Teilweiser oder vollständiger Sehverlust
- Halos oder andere Sehprobleme sehen
- Doppelbilder
- Lichtempfindlichkeit

## Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann Sie begonnen haben, Sehstörungen zu haben, wie schwer sie sind und wie lange sie andauern
- Wenn Sie in der Vergangenheit Sehprobleme hatten, wie z. B. trockene Augen oder Glaukom, und wenn sich diese Symptome verschlimmert haben
- Wenn Sie kürzlich eine Augenverletzung hatten, mit der Einnahme eines neuen Medikaments begonnen haben oder Chemikalien ausgesetzt waren
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen
- Wenn Sie Diabetes haben
- Wenn Sie andere Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen oder Übelkeit haben
- Wann Sie das letzte Mal eine Augenuntersuchung hatten

## Rote Flaggen:

- Wenn Sie plötzliche und schwere Symptome haben, wie z. B. plötzliche Sehstörungen, Augenschmerzen, Rötung oder ungewöhnliche Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht und Blendung
- Unfähigkeit, aufgrund von Augenproblemen regelmäßige Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen
- Allmählicher oder plötzlicher Sehverlust

**Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme.**



## Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Onkologieteams für Augenuntersuchungen beim Augenarzt
- Tragen Sie eine Sonnenbrille, um Ihre Augen vor den schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, achten Sie darauf, die Richtlinien für eine gute Flüssigkeitsversorgung Ihrer Augen und für das Reinigen, Befeuchten und Austauschen von Linsen zu befolgen
- Wenn Sie Diabetes haben, halten Sie Ihren Blutzuckerspiegel gut unter Kontrolle, um das Risiko von Augenerkrankungen zu verringern
- Befolgen Sie einen gesunden Lebensstil, um sowohl Ihre Augen als auch Ihren Körper zu pflegen
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

# HERZPROBLEME

## BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)

Kombination für Melanom

*Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen*

### Was sind die Symptome?

- Das Gefühl, dass Ihr Herz einen Schlag aussetzt, flattert oder zu stark oder zu schnell schlägt
- Änderungen des Energieniveaus
- Völlegefühl oder Kurzatmigkeit im Ruhezustand oder bei Aktivität
- Eine Änderung eines bereits bestehenden Hustens oder Keuchens (ein Pfeifgeräusch beim Atmen)
- Starkes Schwitzen
- Schwellungen in den Armen oder Beinen (einschließlich Knöchel)
- Schwindel
- Ohnmacht
- Brustschmerzen

### Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann bei Ihnen eines dieser Symptome aufgetreten ist, wie stark es ist und wie lange es anhält
- Wenn Sie eines dieser Symptome hatten, bevor Sie mit BRAFTOVI/MEKTOVI begonnen haben, und wenn sie sich verschlimmert haben
- Wenn Ihnen in der Vergangenheit gesagt wurde, dass Sie an einer Herzerkrankung leiden
- Was macht die Symptome schlimmer oder besser
- Wenn Sie kürzlich neue verschriebene oder rezeptfreie Medikamente hinzugefügt haben
- Wenn Sie zuvor eine Bestrahlung hatten

### Rote Flaggen:

Wenn diese Symptome bei Ihnen plötzlich auftreten.

- Jeder Brustschmerz
- Atembeschwerden
- Ohnmacht
- Sie sind aufgrund Ihrer Symptome nicht in der Lage, Ihre typischen Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen

**Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme.**



### Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Onkologieteams für Tests an Ihrem Herzen
- Achten Sie darauf, genug Flüssigkeit zu trinken, um hydratisiert zu bleiben
- Vermeiden Sie es, Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen, die das Herz oder das Gehirn beeinflussen (wie Marihuana, Schlaftabletten oder Stimulanzien), es sei denn, Ihr Gesundheitsdienstleister hat Sie dazu aufgefordert
- Befolgen Sie einen gesunden Lebensstil, um sowohl Ihr Herz als auch Ihren Körper zu pflegen
- Wenn Sie Medikamente für Ihren Blutdruck oder Ihr Herz einnehmen, stellen Sie sicher, dass Sie diese wie verordnet einnehmen und keine Dosen auslassen. Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

# GELENKSCHMERZEN, SCHWELLEN ODER STEIFIGKEIT

**BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib)**

Kombination für Melanom

*Melden Sie sich sofort in der Praxis Ihres Onkologen*

## Was sind die Symptome?

- Gelenkschmerzen
- Gelenksteife
- Gelenkschwellung
- Schwierigkeiten beim Gehen oder bei der Durchführung Ihrer täglichen Aktivitäten
- Rötung um ein Gelenk

## Was Sie Ihrem onkologischen Teammitglied mitteilen sollten:

- Wann diese Symptome begannen, was sie verursacht und wie lange sie anhielten
- Welche Gelenke sind betroffen
- Wenn Sie in der Vergangenheit jemals Gelenkprobleme hatten und wenn sich Ihre Symptome verschlimmert haben
- Alles, was Sie zu Hause versucht haben, um die Symptome zu behandeln

## Rote Flaggen:

- Wenn Sie plötzliche oder schwere Gelenkschmerzen, -schwellungen oder -steifheit haben
- Wenn das Gelenk deformiert aussieht
- Wenn Sie das Gelenk (z. B. Ihren Knöchel) nicht belasten oder überhaupt nicht verwenden können

**Rufen Sie sofort die Praxis Ihres Onkologen an. Wenn niemand erreichbar ist, gehen Sie direkt in die Notaufnahme.**



## Umgang mit Ihren Nebenwirkungen:

- Fragen Sie Ihr Onkologieteam nach der Verwendung von Entzündungs-/Schmerzmitteln wie Aspirin, Ibuprofen oder Naproxen, um Schmerzen und Steifheit zu lindern. Fragen Sie sie, wie viel sie nehmen sollen
- Legen Sie mehrmals täglich für 15 Minuten einen Eisbeutel auf die geschwollenen Gelenke
- Halten Sie das Gelenk, wann immer Sie können, über Ihrem Herzen, um Schwellungen zu reduzieren
- Verwenden Sie Gummiband oder Klebeband auf dem Gelenk, um es zu stützen
- Vermeiden Sie Aktivitäten, die Schmerzen verursachen, aber versuchen Sie, wenn möglich, eine gewisse Trainingsroutine beizubehalten
- Wenn Sie während der Behandlung Medikamente einnehmen, benachrichtigen Sie Ihr Onkologieteam

# ANDERE SYMPTOME, AUF DIE SIE ACHTEN SOLLTEN

Nachfolgend sind weitere Symptome aufgeführt, die bei der Einnahme von BRAFTOVI™ (encorafenib)/MEKTOVI® (binimetinib) auftreten können. Achten Sie genau auf alle mit einem Häkchen markierten Symptome. Bitte rufen Sie das Büro an, wenn Sie eines dieser Symptome entwickeln, und erwägen Sie, direkt in die Notaufnahme zu gehen, wenn Sie eines der Warnsignale haben.

✓	Symptome	Rote Flaggen (Anzeichen dafür, dass etwas Ernstes vor sich geht, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert)
	Veränderungen des Stuhlgangs oder Verstopfung (seltener Stuhlgang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihr Stuhl schwarz oder rot ist, plus Sie Schmerzen und Fieber haben (wie von Ihrem Onkologische Praxis)</li> </ul>
	Durchfall (weicher oder häufiger Stuhlgang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starke Schmerzen im Magen; Hocker, die sind blutig sind oder wie Teer aussehen</li> </ul>
	Schwindel (Benommenheit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie ohnmächtig werden</li> </ul>
	Müdigkeit (sich schwach oder müde fühlen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie ohnmächtig werden oder zu schwach sind, um aus dem Bett aufzustehen</li> </ul>
	Fieber (hohe Temperatur plus oder minus Schüttelfrost und Müdigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihre Temperatur über 40 °C steigt oder Sie haben eine Temperatur über 38,5 °C und Sie starke Schüttelfrost haben, schwach sind oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen haben</li> </ul>
	Kopfschmerzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie sehr schmerzhaft Kopfschmerzen haben (die „schlimmsten Kopfschmerz Ihres Lebens“), Kopfschmerzen, die nicht nach ein paar Stunden weggehen oder Kopfschmerzen mit Fieber, Nackenschmerzen oder Steifheit und/oder Hautausschlag</li> </ul>
	Muskelschmerzen, Schmerzen, Krämpfe oder Schwäche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn diese Symptome zusammen mit dunklen, rötlicher Urin</li> </ul>
	Übelkeit (Gefühl, als würde man sich übergeben)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie also unkontrollierte Übelkeit haben Sie vom Essen und/oder Trinken abhalten</li> </ul>
	Nervenprobleme in Ihrem Gesicht (sabbern, Probleme beim Lächeln haben oder Ihr Mund scheint „hängend“ zu sein)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie Schwierigkeiten beim Sprechen haben oder andere haben im Bereiche Ihres Körpers, die schwach warden oder so Sie können nicht bewegen</li> </ul>

✓	Symptome	Rote Flaggen (Anzeichen dafür, dass etwas Ernstes vor sich geht, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert)
	Reaktionen auf die Sonne (Sonnenbrand; rote, schmerzhaft, trockene, juckende Haut, die sich heiß anfühlt; Sonnenausschlag; Hautirritationen; Beulen; verdickte, trockene, faltige Haut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie am ganzen Körper Rötungen oder Blasen haben auf Ihrer Haut oder in Ihrem Mund und/oder Ihrem Haut schält</li> </ul>
	Kurzatmigkei (Atembeschwerden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wieder zu Atem zu kommen sich ausruhen</li> <li>• Wenn Sie Kurzatmigkei und Brustschmerzen haben und/oder Ohnmacht</li> </ul>
	Hautentzündung (Schwellung) in bestrahlten Bereichen	—
	Magenschmerzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie plötzliche Schmerzen oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Haut haben Magen, Blut im Stuhl, Sie erbrechen Blut, und/oder Ihre Haut oder Ihre Augen verfärben sich gelb</li> </ul>
	Schwellungen in Armen oder Beinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie eine warme, empfindliche Stelle an Ihrem Bein haben das wird nicht kühler, wenn man Eis darauf legt, und/oder wenn die Stelle juckt oder kribbelt, und/oder die Schmerzen werden ohne Grund schlimmer</li> </ul>
	Urin, dunkel oder rötlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie hellrotes Blut im Urin haben oder wenn gleichzeitig wird Ihnen auch schwindelig oder Schmerzen im Rücken oder in der Seite, ein metallischer Geschmack Ihr Mund, Übelkeit im Magen, sind Erbrechen, starke Müdigkeit, Kurzatmigkei Atem und/oder Schwellung von Arm, Beinen oder der Gesicht</li> </ul>
	Wasserlassen, weniger als gewöhnlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie auch Blut im Urin haben, Schwellungen den Knöcheln und habe keine Lust zu essen</li> </ul>
	Wasserlassen, mehr als gewöhnlich	—
	Vaginale Blutungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihre Periode stärker als normal ist, Sie Zwischenblutungen haben oder haben jede postmenopausale Blutung</li> </ul>
	Erbrechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie nicht länger essen oder trinken können für 8 Stunden, und/oder Sie erbrechen Blut oder Sie haben starke Bauchschmerzen</li> </ul>
	Erbrechen von Blut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie Blut erbrechen</li> </ul>

# Ihr Dosierungskalender für Braftovi™ (encorafenib)/Mektovi® (binimetinib)

STARTDATUM: \_\_\_\_\_

|                | Datum:           | Tag                      |
|----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Woche 1</b> | ☀ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | ☾ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | BRAFTOVI (enco)  | <input type="checkbox"/> |
|                | Datum:           | Tag                      |
| <b>Woche 2</b> | ☀ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | ☾ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | BRAFTOVI (enco)  | <input type="checkbox"/> |
|                | Datum:           | Tag                      |
| <b>Woche 3</b> | ☀ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | ☾ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | BRAFTOVI (enco)  | <input type="checkbox"/> |
|                | Datum:           | Tag                      |
| <b>Woche 4</b> | ☀ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | ☾ MEKTOVI (bini) | <input type="checkbox"/> |
|                | BRAFTOVI (enco)  | <input type="checkbox"/> |
|                | Datum:           | Tag                      |

bini = binimetinib; enco = encorafenib

Bei vergessener Einnahme von Mektovi (binimetinib): Nehmen Sie keine vergessene Dosis ein, wenn die nächste Dosis innerhalb von 6 Stunden fällig ist. Warten Sie stattdessen und nehmen Sie die Dosis zur gewohnten Zeit ein. Bei vergessener Dosis von Braftovi (encorafenib): Nehmen Sie keine vergessene Dosis ein, wenn die nächste Dosis innerhalb von 12 Stunden fällig ist. Warten Sie stattdessen und nehmen Sie die Dosis zur gewohnten Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die vergessene Dosis auszugleichen.

Nehmen Sie keine zusätzliche Dosis von Braftovi (encorafenib) oder Mektovi (binimetinib) ein, wenn Sie nach der Einnahme Ihrer vorgesehenen Dosis erbrechen.

Weitere Verschreibungs- und Symptominformationen zu Braftovi (encorafenib): [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information_en.pdf)

Weitere Verschreibungs- und Symptominformationen zu Mektovi (binimetinib): [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mektovi-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mektovi-epar-product-information_en.pdf)